





EL SARAMPIÓN es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por un virus.

Se propaga a través del aire por medio de la tos y el estornudo. El Sarampión comienza con fiebre, moqueo nasal, tos, ojos rojos y dolor de garganta y continúa con una erupción cutánea por todo el cuerpo. Complicaciones pueden incluir neumonía, infección a los oídos y diarrea, encefalitis (inflamación al cerebro), convulsiones y muerte. Las complicaciones son más comunes en adultos y niños menores.

CONOZCA LA VERDAD

EL SARAMPIÓN



¿Cuáles son los SÍNTOMAS del Sarampión?

Los síntomas del sarampión generalmente aparecen de 7 a 14 días después que la persona es infectada.

El Sarampión típicamente comienza con:

- Fiebre alta
- Tos
- Moqueo nasal
- Ojos rojos y llorosos (conjuntivitis)
- Una erupción cutánea que usualmente comienza detrás de la orejas o en la cara, de 2 a 7 días después
 - ◊ La erupción cutánea se propaga en la cara, el tronco y extremidades
- Pequeñas manchas blancas aparecen dentro de la boca



Si usted cree que TIENE sarampión o ha estado EXPUESTO(A) a alguien con Sarampión

Póngase en contacto con el Departamento de Salud del Condado de Prince George Lunes a Viernes 8:00 a.m.- 4:30 p.m. llamando al 301-583-3750 or 240-508-5774 (después de horas de atención, feriados y fines de semana) o llame a su doctor. Mantenerse alejado de los demás. Una persona puede propagar el sarampión de 4 días antes y hasta 4 días después que la erupción cutánea se desarrolla. Si usted debe buscar cuidado médico, llame y dígalos que usted piensa que tiene sarampión.



¿Hay TRATAMIENTO para el SARAMPIÓN?

No hay tratamiento específico para el Sarampión. Póngase en contacto con su proveedor médico. Debe consumir líquidos y buena nutrición. Antibióticos pueden ser recetados para tratamiento de infecciones del ojo y oído relacionadas con la enfermedad.



¿Están todos a RIESGO de contraer el Sarampión?

No, Personas quienes:

- Nacieron antes de 1957
- Tienen prueba de haber tenido el sarampión en el pasado
- Tienen inmunidad que es detectada por un examen de laboratorio
- O han recibido 2 dosis de Sarampión que contienen la vacuna (MMR) son considerados inmune.



¿Puede el Sarampión ser PREVENIDO?

Sí, una primera dosis de la vacuna Sarampión (MMR) debe ser administrada a la edad de **12 a 15 meses** con una **segunda dosis al comenzar la escuela (4 a 6 años de edad)**. Bebés de 6 a 11 meses deben tener una dosis de la vacuna Sarampión (MMR) antes de viajar al exterior

Adultos a alto riesgo tales como:

- Los que no han sido vacunados previamente
- Viajeros internacionales
- Estudiantes universitarios
- Trabajadores de cuidado de salud nacidos durante o después de 1957 también deberían recibir 2 dosis de la vacuna Sarampión (MMR).



Chequear sus records de INMUNIZACIÓN.

Si usted no ha recibido la vacuna del sarampión, **debería ser vacunado (a)**.



Llamar al 301-583-3750 or visite www.cdc.gov/measles/index.html para más información acerca del Sarampión.